



## راهنمای واکسیناسیون کووید ۱۹ - ویرایش تیرماه ۱۴۰۱

ردیف	نوع واکسن	مقدار دوز دریافتی	گروه سنی قابل تزریق	مدت زمان نگهداری بعد از باز شدن ویال	فاصله تزریق نوبت اول و دوم	فاصله تزریق نوبت یادآور از دوم یا سوم	واکسن قابل دریافت در نوبت یادآور	تزریق در دوران بارداری	تزریق در دوران شیردهی	پلتفرم واکسن
۱	سینوفارم	0/5 cc	بالای ۵ سال	۱ ساعت پس از باز کردن ویال در صورت نگهداری در یخچال ۶ ساعت	۲۸ روز	۶ ماه	ترجیحاً از واکسن‌هایی با پلتفرم Pr نو ترکیب و یا واکسن‌هایی با پلتفرم مشابه نوبت قبل استفاده شود.	از شروع بارداری تا هفته ۲۹ بارداری	مجاز می‌باشد	ویروس کشته شده
۲	کوو ایران برکت	0/5 cc	بالای ۱۸ سال	۸ ساعت پس از باز کردن ویال	۲۸ روز	۶ ماه		مجاز نمی‌باشد	مجاز نمی‌باشد	ویروس کشته شده
۳	آسترانکا	0/5 cc	بالای ۱۸ سال	۶ ساعت پس از باز کردن ویال	۸ تا ۱۲ هفته	۶ ماه		برای دوز اول توصیه نمی‌شود و در صورت رضایت کتبی مادر و تأیید کمیته دانشجویی از شروع بارداری تا هفته ۲۹ بارداری تزریق شود	مجاز می‌باشد	آدنووایروس
۴	پاستوکوک	0/5 cc	بالای ۵ سال	۲ ساعت پس از باز کردن ویال	۲۸ روز	۶ ماه		مجاز نمی‌باشد	مجاز نمی‌باشد	پروتئین نو ترکیب
۵	اسپایکوژن	1 cc	بالای ۱۸ سال	۶ ساعت پس از باز کردن ویال	۲۱ روز	۶ ماه		مجاز نمی‌باشد	مجاز نمی‌باشد	پروتئین نو ترکیب
۶	رازی کووپارس	0/2 cc	بالای ۱۸ سال	۷۲ ساعت پس از باز کردن ویال	۲۱ روز	۶ ماه		مجاز نمی‌باشد	مجاز نمی‌باشد	پروتئین نو ترکیب
۷	نورا	0/5 cc	بالای ۱۸ سال	۶ ساعت پس از باز کردن ویال				مجاز نمی‌باشد	مجاز نمی‌باشد	پروتئین نو ترکیب
۸	فخراوک	0/5 cc	بالای ۱۸ سال	۵ ساعت پس از باز کردن ویال	۲۰ روز	۶ ماه		فقط واکسن فخراوک و سینوفارم	مجاز نمی‌باشد	مجاز نمی‌باشد